

Bs Trưởng Thạc Sĩ u Loan -


Bình luận xác nhận của Garcia-Teillard và cộng sự đã dẫn chúng tôi đến việc xây dựng câu trả lời dựa trên ba điểm:

- Điều trị nhiễm trùng bằng liệu pháp kháng sinh có mục tiêu và kéo dài có thể can thiệp vào vòng đời của Chlamydia trachomatis, làm giảm tình trạng không phù hợp với kháng sinh và do đó làm giảm hiệu quả;

- Giảm thiểu tình trạng ô nhiễm thu thập sâu bọ gây nên hàng đợi chu kỳ thức ăn và làm giảm đa dạng sinh học;

- Đánh giá vai trò tích cực của các loài hai cánh trong việc truy tìm nhiễm khu vực thành thị bằng cách nâng cao nhận thức về nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục trong các Cơ quan Y tế thông qua thông tin và phòng ngừa, phân biệt giữa các biện pháp bảo vệ và biện pháp tránh thai, với sự gia tăng hiện nay về tình trạng lây nhiễm trong nhóm dân số có năng lực.

Bình luận của Damian Garcia-Teillard và cộng sự liên quan đến xu hướng nhu cầu nâng cao nhận thức về nhiễm Chlamydia trachomatis (Ct) do đường lây truyền qua đường tình dục giúp mở đường cho những câu trả lời và cân nhắc rõ ràng hơn.



Hình ảnh bệnh nhân bị đau mắt hột do Chlamydia trachomatis

Đầu tiên: Vai trò của việc điều trị bệnh kháng sinh của Ct

Có các bài báo chính thức do Liên đoàn nhãn khoa châu Âu biên tập nhằm mục đích chuyển hóa số liệu thu thập về việc sử dụng kháng sinh để phòng và điều trị. Các phiên bản mới nhất của báo cáo này được biết quan trọng là các quốc gia có thu nhập cao, trong khi các quốc gia có thu nhập thấp, nơi bệnh đau mắt hột đang lưu hành, việc sử dụng thuốc kháng sinh hàng loạt là chính trong nỗ lực xóa sổ bệnh.

Ngay cả khi điều trị bằng các tế bào biểu mô kết mạc có thể biến nhiễm các huyết thanh Ct từ D đến K, gây ra các bệnh về sinh dục. Các chủng sinh bệnh của quá trình này được xác định bằng cách tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết sinh dục biến nhiễm bệnh, dẫn đến viêm kết mạc do chlamydia mới phát qua đường tình dục. Viêm kết mạc này biểu hiện là tình trạng viêm ban đầu không mủ trên bề mặt biểu mô với hình dạng các sợi có thể bắt chước viêm kết mạc nang dẹt ngấm tính, dẫn đến chẩn đoán đánh giá thấp. Do đó, những khu vực không lưu hành bệnh đau mắt hột, chẩn đoán phân biệt là một bước quan trọng trong quá trình chẩn đoán. Vì vậy, việc kêu gọi sự chú ý của các Cơ quan Y tế để kiểm soát sự lây lan của bệnh bằng cách cung cấp thêm thông tin về phòng ngừa các trường hợp trung gian của các quốc gia có thu nhập cao (các cuộc khảo sát theo dõi tình hình tình trạng giảm sử dụng bao cao su sau COVID 19 và tình trạng nhiễm mãn dai dùng giả bị n pháp báo và thuốc tránh thai đường uống, được biết là thành thi u niên) là một ưu tiên khác của WHO.

Chlamydia trachomatis cũng đã được phát hiện trong khoang miệng của con người. Do đó, lây nhiễm chlamydia từ hậu họng của bệnh nhân có thể góp phần vào việc lây truyền Ct.

Những câu hỏi quan trọng khác về vấn đề được trình bày liên quan đến việc hiểu các cơ chế của sự tồn tại lâm sàng của Ct vì Ct có thể gây ra tình trạng viêm vùng chậu dẫn đến bệnh mãn tính và vô sinh cũng như ung thư có hoặc không có sự hiện diện của các tác nhân gây bệnh đồng thời và làm giảm sự phát triển khả năng kháng thuốc và hiểu rõ tiêu chuẩn của các thuốc kháng sinh mới, cũng như của các loại kháng sinh cũ và đã được biết đến rằng tetracycline, trong các nghiên cứu lâm sàng khác nhau.

Thứ hai: Vai trò của ô nhiễm thuốc trừ sâu

Vì các giấm thí u ô nhiễm thu hoạch sâu là bọ t bu c. Thu hoạch sâu được s d ng r ng rãi đ ch ng côn trùng trong nông nghiệp và ch ng mu i, ru i trong môi tr ng đô th .

Ô nhiễm thu hoạch sâu cũng có th nh h ng đ n các vùng nông thôn; khi tr i m a, thu hoạch sâu trôi vào sông, làm gi m s s ng còn c a cá và gây ra s th tinh c a t o c a sông. Đ làm rõ tình hu ng này, c n ph i nh n m nh r ng cái g i là quy đ nh v v i c s d ng b n v ng các s n ph m b o v th c v t đã đ c trình lên Ngh v i n châu Âu vào tháng 6 năm 2022, v i m c tiêu đ y tham v ng là gi m m t n a thu hoạch sâu vào năm 2030 đ gi m tác đ ng c a thu hoạch sâu đ i v i s c kh e con ng i và môi tr ng. Nh ng hi n t i, c h i đã b b l .

Garcia-Teillard và c ng s đã báo cáo đ ng v các môi tr ng s ng khác nhau c a côn trùng các c ng đ ng nông thôn so v i đ i u ki n v sinh các khu v c thành th . Cũng b t bu c ph i đánh giá s can thi p, báo cáo bài vi t c a Robinson et al, trong đó đ nh nghĩa *Musca sorbens* là vect chính c a tính đ c hi u đ i v i mùi phân ng i. Có th làm sáng t m t s thái đ c a loài này.

Th ba: Vai trò c a các loài hai cánh trong v i c truy n b nh ở khu v c thành th (*Musca sorbens*, *Scatophaga stercoraria* và các loài liên quan)



Hình nh Ru i *Musca sorbens*

Musca sorbens (Loài: *M. sorbens*, B : Diptera, L p: Insecta), ru i ch ho c ru i tìm m t, có ngo i hình r t gi ng v i ru i nhà (*Musca domestica*), và nó là v t trung gian gây b nh đau m t h t. *Musca sorbens* thích phân ng i đ sinh s n, v i nh ng con cái b thu hút b i các ch t bán đ n d bay h i và sau đó truy n b nh khi ăn.

Ruồi phân vàng *Scathophaga stercoraria* (L.) (Diptera: Scathophagidae) là loài ruồi phân bọ rình rãi và có nhiều mối liên quan đến phân của các loài động vật có vú lớn. Mặc dù *S. stercoraria* được coi là loài chuyên ăn phân bò, nhưng nó có thể sinh sản thành công trên phân của các loài động vật có vú lớn khác, chẳng hạn như cừu, ngựa, heo và chó. *Sarcophaga carnaria* (Diptera: Sarcophagidae) xâm nhập vào nhà vì nó bị thu hút bởi mùi của các chất thải mà thú cưng ăn.

Hơn nữa, điều cần lưu ý là *Chlamydia* có thể tồn tại trong ruồi, bàn chân và vòi trong tối đa 6 giờ và có thể làm ô nhiễm các loài thực phẩm và đồ vật khác nhau mà con người có thể tiếp xúc.

Trần Thị Cẩm, Garcia-Teillard và cộng sự xác nhận đúng cách ruồi mắt thành phố (trên các vùng nông thôn có điều kiện vệ sinh kém), ruồi là vật trung gian vô hại; thay vào đó, việc truyền bệnh xảy ra thông qua quan hệ tình dục hoặc qua tay bẩn do tiếp xúc với vùng sinh dục bị nhiễm bệnh, mà các tác giả gọi là "con đường lây nhiễm qua đường tình dục". Các tác giả báo cáo việc suy giảm trong giáo dục giới tính và các biện pháp lây truyền qua đường tình dục và các phương pháp phòng ngừa, như đã đề cập trước đó. Có sự nhầm lẫn rõ ràng giữa "biện pháp bảo vệ" (Đội học IULM báo cáo doanh số bán bao cao su giảm) và "thuốc tránh thai" (tức là "viên thuốc tránh thai sáng hôm sau": levonorgestrel) và sự gia tăng hiện nay trong sự lây lan của các bệnh nhiễm trùng trong nhóm dân số có năng lực. Do đó, việc cải thiện vệ sinh vùng kín và thông tin tình dục sẽ nâng cao mức độ nhận thức và phòng ngừa.

Nguồn: Dành cho <https://www.mdpi.com/2076-0817/13/5/414>