

Bs Phan Thị Giao Uyên -

ĐỀ NGHỊ

Bệnh lỵ là một trong những bệnh lây truyền qua đường tình dục hay tiếp xúc. Bệnh lây truyền chủ yếu qua quan hệ tình dục đường âm đạo, đường miệng và đường hậu môn.

NGUYÊN NHÂN/ YẾU TỐ NGUY CƠ

Song cầu khuẩn Gram âm Neisseria gonorrhoeae gây ra

CHẨN ĐOÁN

3.1. Triệu chứng lâm sàng

Thời gian ủ bệnh ở nam giới trung bình từ 3-5 ngày. Ở nữ giới thời gian ủ bệnh thường kéo dài hơn, trung bình 5-7 ngày. Thời gian này người bệnh không có triệu chứng nhưng vẫn có khả năng lây lan cho người khác.

3.1.1. Nghi ngờ ở người không bị nhiễm

- Nam giới: thường có biểu hiện tiết dịch niệu đạo và tiểu buốt. Khám thấy dịch tiết niệu đạo có thể ít hoặc nhiều, nhầy hoặc mủ.

Bệnh lỵ

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 23 Tháng 12 2024 14:39 -

- **Nội giới:** thường không có triệu chứng rõ ràng, đối với 50% bệnh nhân có tình trạng âm đạo bất thường, tiểu buốt, đau vùng bụng dưới và đau khi quan hệ tình dục. Khám thấy dịch âm đạo và viêm cổ tử cung, có thể có mủ. Phần lớn bệnh nhân không có triệu chứng rõ ràng nên không được phát hiện và điều trị.

- **Lưu trữ:** phần lớn không có triệu chứng ở cả hai giới; đôi khi có đau hoặc tình trạng mất cân bằng, trữ.

- **Lưu huỳnh:** chủ yếu không có triệu chứng, có thể đau họng nhẹ và viêm họng.

[Xem tiếp đây](#)