

Sán lá gan

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 08 Tháng 4 2013 07:22 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 08 Tháng 4 2013 08:03

Ths Bs Trồng Trọt Kiện Loạn- Khoa Vi Sinh

Việt Nam, chúng ta chú ý nhiều đến sán lá gan hơn, vì bệnh này rất phổ biến ở các vùng nông thôn đang phát triển. Hiện nay, bệnh sán lá gan liên tục phát triển mạnh mẽ nhiều nơi và ít nhất là đã có đến 45 tỉnh, thành phố ghi nhận có các ca bệnh này.

Người bị bệnh sán lá gan thường có những triệu chứng sốt thất thường, ngứa ngáy, phù nề, rối loạn tiêu hóa, chán ăn, buồn nôn, thiếu máu, đau tức ở vùng gan... Bệnh nhân có thể bị vàng da, nôn ra máu, rối loạn tim mạch. Trồng Trọt và không đi du lịch khắp nơi có thể dẫn tới nhiễm sán lá gan, áp xe gan thoái hóa, rất dễ tử vong.

Tác nhân gây bệnh: - Tên tác nhân: + Sán lá gan nhỏ: có 3 loài *Clonorchis sinensis*; *Opisthorchis viverrini*; *Opisthorchis felinus*. + Sán lá gan lớn: có 2 loài *Fasciola hepatica*; *Fasciola gigantica*.

- Hình thái: Sán lá gan lớn và nhỏ đều có hình lá, thân dẹt và kích thước khác nhau tùy loài; loài sán lá gan lớn kích thước lớn hơn rất nhiều so với sán lá gan nhỏ. Cả hai sán đều là loài ký sinh, vừa có tình hoàn và buồng trứng trên mặt cơ thể sán.

- Khả năng tồn tại trong môi trường bên ngoài: Trứng sán lá gan có vỏ mỏng nên tồn tại ở môi trường bên ngoài rất kém.

Sán lá gan

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 08 Tháng 4 2013 07:22 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 08 Tháng 4 2013 08:03

