

Bs Pḥ m Thanh Tùng - Khoa Ngọ i TH

I. GỊ I PḤ U

- Tị n lị t tuỵ n (TLT) là ṃ t tuỵ n đ̣ i bàng quang và ḅ c quanh nị u đ̣ o sau. TLT ngoài cḥ c năng ngọ i tị t (tị t ra tinh đ̣ ch đ̣ vào nị u đ̣ o) còn có cḥ c năng ṇ t tị t. Tinh đ̣ ch đ̣ c tị t ra ḅ i nhị u ̣ ng tị n lị t và đ̣ vào nị u đ̣ o ̣ rãnh hai bên ḷ i tinh. Trong TLT còn có 1 túi ḅ t nḥ g̣ i là túi ḅ u đ̣ c TLT có ḷ đ̣ ̣ gị a ḷ i tinh. Túi là di tích c̣ a đ̣ u đ̣ i ̣ ng c̣ n trung tḥ n và đ̣ c coi nḥ ṭ ng ̣ ng ṿ i ṭ cung và âm đ̣ o ̣ ṇ .

- TLT chia làm 3 thùy là thùy pḥ i và thùy trái ngăn cách nhau ḅ i ṃ t rãnh ̣ ṃ t sau. Thùy tḥ 3 g̣ i là eo TLT hay thùy gị a. Thùy gị a ṇ m gị a nị u đ̣ o và ̣ ng phóng tinh.

U x t i n l i t t u y n

V i t b i B i e n t p v i e n

Th b a, 22 Th á n g 4 2014 08:07 - L n c p n h t c u i Th b a, 22 Th á n g 4 2014 08:42

Trong tháng vừa qua	Không lần nào	< 1/5 lần	< 1/2 lần	1/2 lần	> 1/2 lần	Gần như luôn luôn	Điểm
1. Đái không hết	0	1	2	3	4	5	
2. Đi đái lại < 2h	0	1	2	3	4	5	
3. Đái ngập ngừng	0	1	2	3	4	5	
4. Đái gấp	0	1	2	3	4	5	
5. Đái tia nhỏ	0	1	2	3	4	5	
6. Rặn mới đái được	0	1	2	3	4	5	
	Không	1 lần	2 lần	3 lần	4 lần	5 lần	
7. Đái đêm	0	1	2	3	4	5	
Tổng điểm							

Đánh giá tình trạng rối loạn chức năng tiểu tiện theo thang điểm IPSS

Chất lượng cuộc sống	Hoan nghênh	Tốt	Khá	Tạm	Khó chịu	Khổ	Khổ sở
Bạn cảm thấy như thế nào nếu như bạn phải sống hết quãng đời còn lại với những triệu chứng này?	0	1	2	3	4	5	6

Đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường và bệnh thận mạn tính bằng bảng khảo sát

$$V = \frac{\pi}{6} \times d_1 \times d_2 \times d_3$$

Đánh giá tình trạng rối loạn chức năng tiểu tiện theo thang điểm IPSS là một công cụ đánh giá tình trạng rối loạn chức năng tiểu tiện. Công cụ này được sử dụng để đánh giá tình trạng rối loạn chức năng tiểu tiện ở bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường và bệnh thận mạn tính. Công cụ này được sử dụng để đánh giá tình trạng rối loạn chức năng tiểu tiện ở bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường và bệnh thận mạn tính. Công cụ này được sử dụng để đánh giá tình trạng rối loạn chức năng tiểu tiện ở bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường và bệnh thận mạn tính.