

Bs CKI Nguyễn Hưu Anh - Khoa GM-HS

ĐỐI CỐI NG

Cuộc mổ thành công tùy thuộc mức độ phản ứng vào sự chăm sóc sau mổ. Giai đoạn ngay sau mổ là giai đoạn có nhiều rủi ro về sinh lý bao gồm các biến chứng về hô hấp, tuần hoàn, kích thích, đau, rối loạn chức năng thận, rối loạn đông máu, hạ nhiệt độ...gây ra do gây mê hoặc do phẫu thuật. Để phát hiện sớm các biến chứng này cần có nhóm nhân viên được huấn luyện, có kinh nghiệm, cần có các phương tiện để theo dõi bệnh nhân sau mổ. Điều quan trọng trong giai đoạn này là không bao giờ để bệnh nhân chờ đợi mà phải theo dõi sát mức độ của bệnh nhân.

CHĂM SÓC BỆNH NHÂN NGAY SAU PHẪU THUẬT THÔNG THƯỜNG

1. Vận chuyển bệnh nhân, thay đổi tư thế

Sau mổ khi đổi tư thế, vận chuyển bệnh nhân từ bàn mổ sang xe đẩy hay giường bệnh cần phải nhẹ nhàng. Thay đổi tư thế đột ngột có thể gây tụt huyết áp, trụy mạch, choáng. Trong phẫu thuật bệnh nhân nằm và vận chuyển bệnh nhân không đúng cách hoặc thô bạo có thể gây chấn thương dẫn đến thành công của cuộc phẫu thuật. Do đó tốt nhất là để xe chuyển bệnh nhân nằm bàn mổ và vận chuyển bệnh nhân từ phòng mổ sang xe đẩy.

Viết bởi Biên tập viên

Thứ sáu, 25 Tháng 4 2014 07:47 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 25 Tháng 4 2014 09:28



Chăm sóc bệnh nhân ngay sau phẫu thuật thông thường và mổ nội soi bệnh cholecystitis thông thường

