

Ds. Trần Thị Tuyết Mai – Khoa Dược

1. Tổng quan

Sotorasib là thuốc điều trị nhắm trúng đích, được sử dụng trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ có đột biến gen KRAS G12C ở bệnh nhân đã kháng thuốc sau khi điều trị bằng hóa trị liệu dựa trên platin và/hoặc liệu pháp miễn dịch kháng PD-1/PD-L1. Đặc tính trên gan là một tác dụng không mong muốn thường gặp của sotorasib và có thể dẫn đến tổn thương gan do thuốc.

Sau khi cấp nhật Tóm tắt đặc tính sản phẩm (SmPC) của sotorasib, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe nên tiến hành xét nghiệm chức năng gan thường xuyên hơn cho bệnh nhân đã sử dụng liệu pháp miễn dịch gan này (trong vòng 3 tháng) trước khi bắt đầu dùng sotorasib.

Thông tin này được biết có ý nghĩa trong thực hành lâm sàng, khi nhiều bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ có thể được điều trị tuân theo bệnh thuốc để cải thiện kiểm soát miễn dịch và sau đó chuyển sang điều trị nhắm trúng đích.

2. Đặc tính gan liên quan đến sotorasib

Sotorasib có thể gây đặc tính gan, dẫn đến tổn thương gan do thuốc và viêm gan. Sotorasib có liên quan đến sự tăng tạm thời nồng độ men gan (ALT và AST), phosphatase kiềm và bilirubin toàn phần trong huyết thanh ở các thử nghiệm lâm sàng điều trị đơn trị liệu cho bệnh nhân chuyển thành ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC). Trong tổng số 549 bệnh nhân được điều trị đơn trị liệu sotorasib 960 mg cho NSCLC, tỷ lệ đặc tính gan cao nhất ở nhóm bệnh nhân đã điều trị miễn dịch gan này (≤ 3 tháng) (40%) trước khi bắt đầu dùng sotorasib, so với bệnh nhân ngừng bắt đầu dùng sotorasib hơn 3 tháng sau liệu điều trị miễn dịch cuối cùng (18%) hoặc bệnh nhân ngừng bắt đầu trị liệu miễn dịch (17%).

Thuốc Sotorasib

Vit b i Biên t p viên

Th ba, 08 Tháng 9 2026 18:21 -



[Xem tiếp thủ dâ](#) Sotorasib (Lumakras)