

BSCKII. Tràn Quốc Chiên - Trung tâm Ung bướu

PHẦN 2. Điều trị ung thư biểu mô tế bào gan giai đoạn sớm [BCLC 0-A] và trung gian [BCLC B]

MẬT SỞ CÁC KHUYẾN NGHỊ HIỆN NAY

(1) Quy trình lý bởi nhóm đa chuyên khoa (MDT – Multidisciplinary Team) được khuyến nghị mạnh mẽ cho bệnh nhân HCC giai đoạn sớm và trung gian [II, A].

(2) Cắt gan được khuyến nghị cho bệnh nhân có mật khối u đơn độc > 2 cm và không có bằng chứng tăng áp tĩnh mạch cửa (BCLC 0 đến A) [II, A].

(3) Cắt gan được khuyến nghị cho bệnh nhân có chức năng gan Child-Pugh A, không có tăng áp tĩnh mạch cửa đáng kể hoặc các chứng chỉ khác [III, A].

(4) Cắt gan có thể được cân nhắc cho bệnh nhân được chọn lọc kỹ, có chức năng gan Child-Pugh B đến nhẹ và/hoặc mật độ tăng áp tĩnh mạch cửa nhẹ với sự cân nhắc cẩn thận nguy cơ mất bù [III, B].

(5) Cắt gan được khuyến nghị như một lựa chọn cho bệnh nhân HCC giai đoạn trung gian (BCLC B) không phù hợp với các liệu pháp trong điều trị mạnh [II, A].

(6) Bệnh nhân xơ gan, phình giãn tĩnh mạch cửa xâm lấn thì ưu tiên được khuyến nghị [III, A].

(7) Điều trị bằng vi sóng (MWA – Microwave Ablation) hoặc điều trị bằng sóng cao tần (RFA –

Radiofrequency Ablation) để điều trị khu vực nghi ngờ trong HCC giai đoạn rất sớm (BCLC 0) [II, A].

(8) MWA hoặc RFA để điều trị khu vực nghi ngờ nhỏ nhất là chọn thay thế cho phẫu thuật cắt gan ở bệnh nhân HCC giai đoạn sớm (BCLC A) [II, A].

(9) Việc lựa chọn giữa cắt gan hay đốt u cần xem xét các giới hạn kích thước và phải điều chỉnh theo lưu ý của MDT [III, A].


(10) MWA hoặc RFA có thể điều trị khu vực nghi ngờ cho các khối u đơn độc có đường kính 3–5 cm hoặc bệnh đa ổ (≤ 3 khối u, mỗi khối ≤ 3 cm) (BCLC A) nhưng bệnh nhân không phải là ứng viên cho phẫu thuật cắt gan hoặc nhất phải ngừng ăn trước khi ghép gan toàn bộ đúng vị trí (OLT – Orthotopic Liver Transplantation) [II, B].

(11) Điều trị toàn thân bằng thuốc ức chế tyrosine kinase (TKIs – Tyrosine Kinase Inhibitors) hoặc các thuốc phải tiếp diễn trên thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch (ICI – Immune Checkpoint Inhibitors) sau phẫu thuật cắt gan hoặc đốt u không điều trị khu vực nghi ngờ [I, E].

Ung thư biểu mô tế bào gan (tt)

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 06, 06 Tháng 5 2026 20:19 - Lần cập nhật cuối Thứ 06, 06 Tháng 5 2026 20:36



[Xem tiếp tại đây](#)