

Bs Nguyễn Minh Tú -

Việc trở ngại khi thành công các ngón tay bẹt có thể không chỉ dựa trên kỹ thuật vì phẫu thuật, mà cả các lo ngại thu hẹp thóp ng dùng sau phẫu thuật. Ba lo ngại thu hẹp thóp ng dùng sau khi phẫu thuật, đó là thu hẹp kháng sinh, thu hẹp chèn ép cơ thóp và thu hẹp chèn ép động mạch. Thu hẹp kháng sinh phải được sử dụng trong phẫu thuật và sau phẫu thuật vì chèn ép thóp ng phải được phẫu thuật, thời gian dài và tiếp xúc với vết thóp ng kéo dài. Nguyên lý do phải biết tại sao thu hẹp chèn ép cơ thóp và thu hẹp chèn ép động mạch nên được sử dụng sau khi phẫu thuật là:

1. Khả năng đông máu tăng sau chèn ép thóp ng và hoạt động, đó là báo hiệu của các thay đổi sinh lý
2. Adrenaline được tiết ra sau chèn ép thóp ng và hoạt động; do đó, bệnh nhân dễ bị co thắt mạch, tăng tiểu cầu và sự gia tăng đông máu, dễ dàng dẫn đến huyết khối
3. Co cứng và huyết khối có thể dễ dàng gây ra bởi vì đường kính nhỏ, mà thóp ng là 1–3 mm (tỉ lệ tiêu chuẩn là 0,2–0,5 mm) và dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố hóa lý
4. Có nguy cơ huyết khối cao hơn do lực co thắt nhỏ đối với thông nòng gây ra bởi đường kính nhỏ và lưu lượng máu thấp. Cần sử dụng thuốc chèn ép cơ thóp và thuốc chèn ép động mạch vì các thí nghiệm đã chứng minh rằng đường kính của mạch càng nhỏ thì càng có nhiều khả năng huyết khối xảy ra, vì mạch 1 mm có mức độ hẹp thấp tiêu chuẩn cao gấp đôi so với mạch 2 mm. Trong Bảng 4.1, các lo ngại thu hẹp thóp ng được sử dụng được hiển thị.

Đặc điểm, chẩn đoán, phân loại và biện pháp phòng ngừa đối với các lo ngại thu hẹp này được mô tả như sau.

Bảng 4.1 Các thu hẹp thóp ng dùng

Viết bởi Biên tập viên
Thứ 7, 13 Tháng 9 2023 14:12 -

Thuốc kháng sinh	Penicillin, cephalosporin, macrolide, v.v., dùng riêng lẻ hoặc kết hợp
Thuốc chống đông	dextran 6% 40 iv nhỏ giọt (500–1000 ml/ngày); hoặc aspirin (3 lần/ngày, mỗi lần 0,5–1 g); hoặc tiêm glucose 5% 1000 ml + heparin thấp phân tử 1500 IU (đối với trẻ em: 11–150 U/kg + tiêm glucose 5% 500 ml), duy trì trong 24 giờ
Thuốc chống co thắt	Benzazoline 25 mg hoặc papaverine 30 mg/6–8 giờ, tiêm bắp, dùng đơn độc hoặc phối hợp

THE OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL HAS REVIEWED THE MATTER AND HAS DETERMINED THAT THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED.