

Ths.Bs Nguyễn Xuân Lâm -

1. TỔNG QUAN

Thoát vòm nội (IH: Internal Hernia) được định nghĩa là hiện tượng chui xuống cách biệt thông qua ruột hoặc ống khác trong ổ bụng qua một khe phúc mạc hoặc mạc treo (bám dính hoặc mạc phôi) hoặc hậu phúc mạc bên trong ổ bụng. Khác với thoát vòm thành bụng và thoát vòm, sự chui xuống các ống trong IH xảy ra bên trong khoang ổ bụng nên là ra bên ngoài.

Thoát vòm nội là một nguyên nhân hiếm gặp của ổ bụng ngoại khoa và ruột non đóng vai trò quan trọng. IH có tần suất trên mổ xác khoảng 0,2–0,9% và là nguyên nhân của 0,6-5,8% các trường hợp ruột non.

Biểu hiện thông thường gặp nhất của IH là tình trạng ruột cụt. Tuy nhiên, biểu hiện lâm sàng có thể thay đổi từ các triệu chứng nhẹ đến tình trạng ổ bụng cấp phải thu nhập vào thời gian xảy ra và khả năng phẫu thuật túi thoát vòm cũng như có hay không sẽ nghiêm trọng và hoặc tử vong.


2. BỆNH HỌC

Bệnh học của IH có thể được phân loại thành khiếm khuyết bẩm sinh hoặc mắc phải của khoang ổ bụng (Bảng 1). Thoát vòm nội mắc phải được gây ra bởi sự viêm, chấn thương hoặc phẫu thuật phúc mạc. IH đã được báo cáo sau các phẫu thuật ổ bụng hoặc nội soi và hiện nay chiếm tỷ lệ cao hơn các trường hợp bẩm sinh.

Thoát vòm mũi

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 18 Tháng 9 2023 16:19 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 18 Tháng 9 2023 16:52



[Xem thêm nội dung](#) tại đây