

Bs Thái Thị Phương Oanh -

GIỚI THIỆU


Đa ối (Polyhydramnios hay hydramnios) dùng để chỉ lượng nước ối quá nhiều. Nó liên quan đến việc gia tăng nguy cơ các kết cục thai kỳ bất lợi khác nhau, bao gồm sinh non, nhau bong non và dị tật thai nhi.

Đa ối nên được nghi ngờ trên lâm sàng khi kích thước tử cung lớn hơn so với tuần thai (chiều cao tử cung [cm] lớn hơn số tuần thai >3). Chẩn đoán dựa trên siêu âm khi đo thể tích nước ối (AFV) bằng kỹ thuật đo nh lượng không xâm lấn, chứng nhận nh chỉ số ≥ 24 cm hoặc độ sâu xoang ối lớn nhất ≥ 8 cm.

TỔNG MỨC BỆNH

Nhìn chung, tỷ lệ mức bệnh đa ối dao động từ 1-2%. Tỷ lệ này bệnh hơn nhiều phụ thuộc vào tuần thai khi phát hiện siêu âm (non tháng cao hơn, quá ngày tiếp hơn), quần thể nghiên cứu (nguy cơ thấp hay cao, khám siêu âm chỉ định trước khi sinh hoặc trong khi sinh), và sự khác nhau trong tiêu chuẩn chẩn đoán (số đo nh chỉ số AFI so với độ sâu xoang ối lớn nhất).

Trong một loạt hơn 93.000 trường hợp mang thai đến thai kéo dài hơn 6 năm tại một bệnh viện, đa ối được chẩn đoán trong quá trình siêu âm trước khi sinh với tỷ lệ 0,7% và được mô tả với mức độ nh, trung bình hoặc nặng là 66%, 22% và 12%.



[Xem tiếp tại đây](#)