

Ds. Võ Th H i Ph ng -

Ngày 21/07/2026, C quan Qu n lý thu c và s n ph m chăm sóc s c kh e Anh (MHRA) thông báo c p nh t thông tin s n ph m đ i v i t t c các ch ph m ch a domperidon, b sung ch ng ch đ nh s d ng b nh nhân đã đ c ch n đoán ho c nghi ng u t y th ng th n do nguy c xu t hi n các đ t tăng huyết áp n ng.

Domperidon là m t ch t đ i kháng dopamin có đ c tính ch ng nôn. Thu c này đ c c p phép s d ng cho ng i l n và tr em t 12 tu i tr lên. U t y th ng th n là nh ng kh i u hi m g p c a tuy n th ng th n và th ng đ c ch n đoán qua các ph ng pháp ch n đoán hình nh.



Hình nh thu c Domperidon (Motilium)

M t đánh giá g n đây ở châu Âu v d li u an toàn c a domperidon đã xác đ nh m i liên h gi a domperidon và các đ t tăng huyết áp nghiêm tr ng ở b nh nhân m c u t y th ng th n sau khi nh n đ c m t s báo cáo v bi n c này. Do đó, các khuy n ngh đã đ c đ a ra đ c p nh t thông tin s n ph m, b sung ch ng ch đ nh s d ng domperidon ở b nh nhân m c u t y th ng th n do nguy c tăng huyết áp nghiêm tr ng.

Các khuy n cáo c p nh t cho cán b y t :

- Ch ng ch đ nh m i: Domperidon hi n ch ng ch đ nh cho nh ng b nh nhân đã đ c ch n đoán xác đ nh ho c nghi ng m c u t y th ng th n.

- Xếp trí bệnh nhân đang dùng thuốc: Người sử dụng domperidon ngay lập tức dời vào các bệnh nhân đã xác định hoặc nghi ngờ mắc u tủy thượng thận và chuyển sang phòng pháp điều trị thay thế phù hợp.

- Nhận biết u tủy thượng thận: Việc sử dụng domperidon có thể làm bộc lộ bệnh u tủy thượng thận tiềm ẩn. Nếu bệnh nhân đang dùng domperidon xuất hiện đợt tăng huyết áp nghiêm trọng, cần cân nhắc thực hiện thêm các xét nghiệm thăm dò/chẩn đoán u tủy thượng thận.

- Chăm sóc giảm nhẹ: Bệnh nhân đang nhận chăm sóc giảm nhẹ cần được cân nhắc, đánh giá cá thể hóa về lợi ích/nguy cơ khi điều trị.

Các khuyến cáo cho bệnh nhân:

- Người uống domperidon: Nếu đã được bác sĩ chẩn đoán mắc u tủy thượng thận. Liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ để được tư vấn các lựa chọn điều trị thay thế.

- Báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ ngay cả sự y tế: Nếu bệnh gặp phải các triệu chứng có thể tăng huyết áp nghiêm trọng, bao gồm: Đau đầu kéo dài/dồn dập

,
Nhìn mờ

,
Khó thở

,
Đau ngực

,...vv.

Tài liệu tham khảo:

1. Medicines and Healthcare products Regulatory Agency. Domperidone: new contraindication in patients with pheochromocytoma due to the risk of severe hypertension. MHRA Drug Safety Update. 2026 Jul;19(12). Available from: <https://www.gov.uk/drug-safety-update/domperidone-new-contraindication-in-patients-with-pheochromocytoma-due-to-the-risk-of-severe-hypertension>

2. Vitturi G, Crisafulli S, Alessi Y, Frontalini S, Stano MG, Fontana A, et al. Global epidemiology of pheochromocytoma: a systematic review and meta-analysis of observational studies. J Endocrinol Invest. 2025;48(12):2813-2825.